

**UNIVERSIDAD NACIONAL  
“JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN”  
ESCUELA DE POSGRADO**



**TESIS**

**FACTORES ASOCIADOS A LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA  
EN MENORES DE CINCO AÑOS ATENDIDOS EN EL  
CENTRO DE SALUD DE SUNAMPE - CHINCHA**

**Para obtener el Grado Académico de Maestro en Salud Pública**

**Presentado por:**

**MARGARITA NORMA CASTRO FUENTES**

**Asesora: Dra. Soledad Dionisia Llañez Bustamante**

**HUACHO – PERÚ**

**2016**

## RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo, determinar la influencia de los factores asociados a la desnutrición crónica en niños menores de cinco años atendidos en el consultorio de crecimiento y desarrollo (CRED) del centro de salud de Sunampe Chíncha; estudio descriptivo de corte transversal, la muestra poblacional estuvo conformada por 60 niños de ambos sexos (30 niños y 30 niñas). Se aplicó encuestas a las madres de estos niños y se utilizó como material de apoyo las historias clínicas y las tarjetas de control de crecimiento y desarrollo. En relación talla para la edad en la muestra estudiada se encontró el 86,67% de niños con talla normal, 11,67% son bajos de talla, y con el 1,67% son altos, se halló un 11,67 % de desnutrición crónica en la zona de estudio repartida en 6,67 % de niños y 5,00% de niñas.

En la relación peso para la talla 70,00% de menores, tiene un peso normal, el 23,33% tienen sobrepeso, y en el 5,00% se presentan entre obesos y desnutridos, los niños de menos edad se hallan con mayor número y porcentaje de normal. En esta población coexiste la desnutrición crónica con sobrepeso.

Se halló que los factores asociados como el desconocimiento del concepto de desnutrición de las madres fue el 35,33%, el cumplimiento al control de los hijos 30,00%, la falta de conocimiento de las consecuencias de la desnutrición en menores de cinco años 48,33%, 31,66% de madres le dan importancia a la leche materna por considerarla mejor alimento; y 13,33% de sus niños siempre toman vitaminas y micronutrientes. Estos últimos no son factores que permiten la presentación de desnutrición en la muestra estudiada, por lo que se afirma que otras serían las causas para la presentación de este problema de salud.

La no significancia estadística se evidencio entre los factores diversos y la desnutrición a valores Chi-cuadrado de Pearson: 0,922 para la inasistencia periódica a los controles de crecimiento y desarrollo, El desconocimiento de los padres sobre alimentación balanceada un 0,073 y para el incumplimiento de los padres al uso de micronutrientes un valor de 0,856.

**Palabras claves:** Desnutrición crónica, Factores de riesgo asociados, Niños menores de cinco años.